

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Préparation :

- matériel nécessaire : plateau,seringue 5ml, aiguille, une ampoule 5 ml de MIDAZOLAM 5mg/5ml utilisée pure.
- concentration 1mg=1ml.
- le produit pur se conserve 24 heures à température ambiante.

Délai d'action :

- 2 minutes par voie IV
- 15 minutes par voie SC
- utilisation sur prescription anticipée

Complications aiguës à risque vital immédiat ou Symptôme réfractaire

Bolus initial de 1 ml = 1 mg de MIDAZOLAM

Evaluer au bout de :
- 2 à 3 mn si voie IV (5 à 6 mn chez sujet très âgé ou patient en situation de grande fragilité)
- 15 mn si voie SC

Persistance des symptômes

oui

Injecter 1 ml = 1 mg de MIDAZOLAM

Réévaluer au bout de :
- 2 à 3 mn si voie IV (5 à 6 mn chez sujet très âgé ou patient en situation de grande fragilité)
- 15 mn si voie SC

Soulagement des symptômes

oui

Arrêter l'injection
Noter la dose utilisée pour la titration en milligrammes de MIDAZOLAM

Le médecin adapte la suite du traitement en fonction de la situation.
En cas de sédation continue au PSE dose horaire = 50 % de la dose totale nécessaire au soulagement des symptômes.
A réévaluer en fonction de l'objectif recherché (score 2 à 4 sur l'échelle de Rudkin).

ANXIOLYSE

Préparation :

- matériel nécessaire : plateau,seringue 1ml, aiguille, une ampoule 5 ml de MIDAZOLAM 5mg/5ml utilisée pure.
- concentration 1mg=1ml.
- le produit pur se conserve 24 heures à température ambiante.

Délai d'action :

- 2 minutes par voie IV
- 15 minutes par voie SC

Anxiété

Anxiété modérée : Bolus initial de 0,2 mg soit 0,2 ml de MIDAZOLAM

Anxiété importante : Bolus initial de 0,4 mg soit 0,4 ml de MIDAZOLAM

Evaluer au bout de 15 minutes si voie SC

Evaluer au bout de 2 - 3 minutes si voie IV

Persistance de l'anxiété

NON

DOSE D'ENTRETIEN AU PSE
= 30 à 50 % de la dose nécessaire à la titration en mg/h.
A réévaluer en fonction de l'objectif recherché (score 1 sur l'échelle de Rudkin)

Utiliser une échelle EVA, EN ou EVS pour quantifier l'intensité de l'anxiété

Surveillance :

- Conservation possible du MIDAZOLAM dans le PSE : 7 jours si dilution dans sérum physiologique uniquement.

- Utiliser l'échelle modifiée de Rudkin pour surveiller la vigilance :

* pour l'anxiété : niveau 1 - patient complètement éveillé et orienté

* pour la sédation : obtention de la régression du symptôme réfractaire qui peut aller si besoin jusqu'au score 4 de l'échelle de Rudkin.

Echelle de Rudkin modifiée :

Score 1 : Patient complètement éveillé et orienté.

Score 2 : Patient somnolent.

Score 3 : Patient avec les yeux fermés mais répondant à l'appel.

Score 4 : Patient avec les yeux fermés mais répondant à l'une stimulation tactile légère, traction sur le lobe de l'oreille.

Score 5 : Patient avec les yeux fermés et ne répondant pas à une stimulation tactile légère.



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)